



Staccato®

Účinná látka: tebukonazol 250 g/l EW

- **Systémový preventivní, kurativní a eradikativní účinek**
- **Stop efekt na rzi**
- **Výborná účinnost proti fusariózám, zvláště v TM kombinaci s přípravkem Charisma**
- **Vynikající účinnost proti fómové hnilobě řepky se silným morforegulačním účinkem**
- **Vhodný TM partner do celé řady směsí s herbicidy, insekticidy a regulátory růstu**

► Charakteristika přípravku

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě se systémovým účinkem k ochraně pšenice, žita a tritikale proti listovým a klasovým chorobám a k ochraně řepky proti fómové hnilobě s morforegulačním účinkem.

Tebukonazol ze skupiny triazolů je přijímán stonky a listy rostlin a je systémově rozváděn do celé rostliny. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci v závislosti na zvolené dávce a infekčním tlaku.

Pšenice, žito, tritikale

► Spektrum účinnosti

Choroby pšenice, tritikale	Účinnost	Dávka / ha
Rez pšeničná <i>Puccinia tritici</i>	◆◆◆◆	0,5 l
Braničnatky <i>Septoria spp.</i>	◆◆◆	max. 2x interval 30 dní
Klasové fusariózy <i>Fusarium spp.</i>	◆◆◆	

Choroby žita	Účinnost	Dávka / ha
Rez žitná <i>Puccinia recondita</i>	◆◆◆◆	0,5 l max. 2x interval 30 dní

Účinnost: výborná ◆◆◆◆ dobrá ◆◆◆ slabá ◆◆ nedostatečná ◆





Řepka

▣ Doporučená aplikace

Fómová hniloba

Na podzim od 4. listu řepky,
na jaře

fómová hniloba,
aplikace při teplotě min. 10 °C

Staccato (0,75–1 l), max. 2x

Morforegulační efekt – řepka ozimá

Podzimní morforegulace

zpomalení dlouhivého růstu,
podpora zimovzdornosti,
podpora růstu kořenů,
zesílení kořenového krčku,
zvýšení zakládání postranních pupenů

Staccato (0,5 l ve fázi 4–5 listů řepky, za každý další list zvýšit dávku o 0,1 l)

Jarní morforegulace

zpevnění a zkrácení stonku,
zvýšení odolnosti proti poléhání,
podpora tvorby postranních větví

Staccato (0,75 l od viditelného 3. internodia do objevení vrcholového květenství)

