



## Představte si inovaci!

# DuPont™ Fontelis®

### FUNGICID

## Nový přípravek ve fungicidní ochraně pro kvalitnější produkci

- ▶ Úplně nová účinná látka penthiopyrad
- ▶ Vysoká účinnost vůči strupovitosti a padlí jabloní a hrušní
- ▶ Vhodný do oblastí s rezistencí k existujícím skupinám účinných látek
- ▶ Vedlejší účinnost vůči černým a skládkovým chorobám
- ▶ Vhodný do systému integrované produkce (SISPO)
- ▶ Neškodný pro včely, dravé roztoče, ploštice a jiný užitečný hmyz (hodnoceno – IOBC)

# Inovativní řešení strupovitosti a padlí ve Vašem sadu

## Charakteristika přípravku

Fontelis® je nový fungicid určený k ochraně Vašich sadů vůči strupovitosti a padlí. Byla prokázána významná vedlejší účinnost vůči černé skvrnitosti na plodech. Pozitivně působí proti skládkovým hnilobám. Přínos účinné látky penthiopyrad (FRAC 7) je v přerušení fungicidních sledů a tím oddálení rizika vzniku rezistence. Účinná látka vykazuje translaminární a lokálně systemický pohyb v ošetřených pletivech. Přípravek působí preventivně, kurativně s reziduálním účinkem a navíc indukuje obranné mechanismy plodiny.

## Antirezistentní strategie, integrovaná produkce

Penthiopyrad patří do skupiny SDHI (FRAC 7) se středním rizikem vzniku rezistence. Aktuálně, na základě registrace přípravku v České republice, maximální počet ošetření je 1x za sezónu. Střídejte účinné látky s odlišným mechanismem účinku.


Fontelis® je neškodný pro včely, dravé roztoče (*Typhlodromus pyri*), plošnice, zlatoočky, mšicomy, atd. (hodnoceno IOBC – Mezinárodní organizace pro biologickou ochranu).

## Doporučení pro aplikaci

Přípravek Fontelis® je možné použít proti strupovitosti jableň a hrušně, od fáze rašení do konce vegetace, v dávce 0,5–0,75 l/ha. Nižší dávku je vhodné použít do tankmixu s jinými fungicidy. Ošetření vůči strupovitosti a padlí doporučujeme provést v období od počátku květu do fáze vytváření plodů.

Účinná látka proniká do pletiv a již hodinu po aplikaci nehrozí její vymytí a není potřeba znovu opakovat postřik.

Plodina	Patogen	Dávka l/ha	Termín aplikace	OL
Jabloně, hrušně	Strupovitost jableň ( <i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pirina</i> ) Padlí jableňové ( <i>Podoshera leucotricha</i> )	0,5–0,75	Kdykoliv od fáze rašení (BBCH 53) do konce vegetace, max 1 x	21 dní



Fontelis® je suspenzní koncentrát na olejové bázi. Přítomnost olejové složky může zvyšovat riziko fytotoxicity v případě kombinace s látkami citlivými na olej (captan) zejména pokud tyto nejsou aplikovány v souladu s omezeními na jejich etiketách.

## Hlavní přednosti přípravku

- ▶ Obsahuje zcela novou účinnou látku se širokým spektrem účinku (SDHI)
- ▶ Vykazuje excelentní preventivní účinnost
- ▶ Vynikající selektivita k opylovačům a užitečnému hmyzu (IOBC studie)
- ▶ Vhodný do systému integrované produkce podle metodiky SISPO
- ▶ Využitelný v rámci antirezistentní strategie (IRM)
- ▶ Rychlá penetrace do rostlinných tkání a translaminární pohyb
- ▶ V deštivém období má vynikající odolnost vůči vymytí
- ▶ Kompatibilita se širokým spektrem účinných látek
- ▶ Pohodlná tekutá formulace (SC)



Počáteční příznaky napadení strupovitostí na rubu listu



Příznaky napadení padlí na plodech

## Obchodní zástupci:

**Ing. Bohumil Štěřba**  
tel.: 602 274 712

**Ing. Pavel Sommer**  
tel.: 602 157 679

**Ing. Petr Kopecký**  
tel.: 602 278 805

## Agronomická služba:

**Ing. Vlasta Čamková**  
tel.: 739 233 766

**Ing. Tomáš Kubát**  
tel.: 603 724 928

**Ing. Milan Brom**  
tel.: 602 160 504

**Libor Pavka**  
tel.: 601 202 522

**Ing. Zdeněk Folk**  
tel.: 602 419 089

**Ing. Soňa Vrátná**  
tel.: 777 305 336

**Ing. František Tretera**  
tel.: 777 173 755

**Ing. Luděk Říčař**  
tel.: 777 314 568

DuPont CZ s.r.o.  
Pekařská 14/628  
155 00 Praha 5  
tel.: 257 414 111  
www.ag.dupont.cz

