

DuPont doporučení pro ochranu ječmene jarního

JEDNO FUNGICIDNÍ OŠETŘENÍ

Soligor® (0,7 l) BBCH 30–59

Soligor® (0,7 l) + Talius® (0,1 l)

Plinker® (1,5 l) BBCH 31–49

Treoris® (1,8–2 l) BBCH 30–59

VÍCE FUNGICIDNÍCH OŠETŘENÍ

Odrůdy náchylné na padlí

Talium® (0,15 l) nebo
Talium® (0,1 l) + Soligor® (0,5–0,7 l)
BBCH 23–31

Acanto® Plus (0,75 l/ha)
BBCH 37–55

Odrůdy náchylné na hnědou
skvrnitost

Soligor® (0,7 l)
BBCH 23–31

Plinker® (1,5 l)
Treoris® (1,8–2 l)
BBCH 37–55

Biplay® SX (35–40 g)

Biplay® SX (30 g) + Starane® Forte (0,25 l)

Express® 50 SX
(25–30 g)
Lze aplikovat
v OPZV II. st. na jaře

00 09 11 12 13 14 21 25 29 30 31 32 37 39 49 51 59 61

Fungicidní ošetření

- Acanto® (pikoxystrobin 250 g)**
 Ideální fungicidní ošetření pro T2 aplikace, strobilurinový TM partner, v dávce 0,5 l proti hlavním listovým a klasovým chorobám (listové skvrnitosti, rzi).
- Acanto® Plus** (pikoxystrobin 200 g; cyprokonazol 80 g) **NOVINKA**
 Robustní fungicidní ošetření proti listovým a klasovým chorobám (listové skvrnitosti, rzi).
- Plinker® (pikoxystrobin 100 g + chlórthalonil 500 g)**
 Fungicidní ošetření pro T2 aplikace proti ramulárii, rynchosporiové a hnědé skvrnitosti a nespecifickým skvrnitostem v dávce 1,5 l.
- Soligor®* (spiroxamin 224 g + prothiokonazol 53 g + tebukonazol 148 g)**
 Kvalitní fungicidní ošetření pro T1–T3 aplikace proti padlí, hnědé a rynchosporiové skvrnitosti ječmene, rzi a klasovým chorobám.
- Talium® (prochinazid 200 g)**
 Fungicidní ošetření pro T1 aplikace proti padlí, ideální TM partner v dávce 0,1–0,15 l ke všem fungicidům.
- Treoris® (penthiopyrad 100 g + chlórthalonil 250 g)**
 Špičkové fungicidní ošetření hlavně pro T2 aplikaci proti listovým skvrnitostem, rzem, nespecifickým skvrnitostem a ramulárii. Pozitivně ovlivňuje fyziologii rostlin a tím i výnos.

Herbicidní ošetření

- Biplay® SX + Starane® Forte**
 (tribenuron-methyl 222 g, metsulfuron-methyl 111 g + fluroxypyr 333 g/l)
 Jarní aplikace až do fáze praporcového listu (BBCH 39) proti dvouděložným plevelům, zejména proti svízeli, zemědýmům, violkám, rozrazilům, kakostům, svlačci, šťovíkům a pcháči, v dávce 30 g + 0,25 l.
- Express® 50 SX** **NOVINKA**
 (tribenuron-methyl 500 g)
 Ošetření jarních ječmenů proti dvouděložným plevelům a pcháči. Lze aplikovat v OPZV II. stupně na jaře.