



# Acanto® Plus

**NOVINKA**

Účinné látky: pikoxystrobin 200 g/l, cyprokonazol 80 g/l SC

**Kvalitní kombinovaný fungicid pro použití v řepce, obilninách, cukrové řepě s vysokou ekonomickou návratností.**

- ▶ Dvě účinné látky pro zdravý a silný porost řepky
- ▶ Eradikativní účinek na rzi
- ▶ Systémový rozvod v rostlině chrání i nové přírůstky
- ▶ Vysoce účinný vůči hlízence, černím a fómové hnilobě s účinností proti plísni zelné
- ▶ Vyšší zisk z ošetřeného hektaru

## ▶ Působení přípravku (systém účinku)

Acanto Plus je vysoce účinný přípravek pro ošetření řepky, obilnin, řepy cukrové vůči širokému spektru houbových chorob. Picoxystrobin působí systemicky, translaminárně a výparem proti širokému spektru chorob. Cyprokonazol působí systémově a kontaktně, čímž poskytuje preventivní, kurativní a eradikativní účinnost. Toto složení přidává jistotě zásahu vůči patogenům.

## Obilniny

### ▶ Spektrum účinnosti

Pšenice, tritikale		
Braničnatka plevová	<i>Phaeosphaeria nodorum</i>	◆◆◆◆
Braničnatka pšeničná	<i>Septoria tritici</i>	◆◆◆◆
Padlí travní	<i>Erysiphe graminis</i>	◆◆◆
Rez pšeničná	<i>Puccinia recondita</i>	◆◆◆◆
Helmintosporióza pšenice/DTR	<i>Helminthosporium tritici-repentis</i>	◆◆◆◆
Žito		
Rhynchosporiová skvrnitost	<i>Rhynchosporium secalis</i>	◆◆◆◆
Padlí travní	<i>Erysiphe graminis</i>	◆◆◆
Rez pšeničná	<i>Puccinia recondita</i>	◆◆◆◆
Ječmen		
Hnědá skvrnitost ječmene	<i>Pyrenophora teres</i>	◆◆◆◆
Padlí travní	<i>Erysiphe graminis</i>	◆◆◆◆
Rhynchosporiová skvrnitost ječmene	<i>Rhynchosporium secalis</i>	◆◆◆◆
Rez ječná	<i>Puccinia hordei</i>	◆◆◆◆
Ramuláriová skvrnitost	<i>Ramularia collo-cygni</i>	◆◆◆

Účinnost: výborná ◆◆◆◆ dobrá ◆◆◆ slabá ◆◆ nedostatečná ◆



## ► Doporučená aplikace

Přípravek Acanto Plus aplikujte v pšenici, žitě, tritikale a ječmeni od růstové fáze – první kolénko až do konce květu preventivně nebo při zjištění prvních příznaků chorob v dávce 0,75–1 l/ha. Max. počet ošetření 2 x za sezonu.

Plodina	Aplikace	Dávka l/ha	Max.
Řepka	Acanto Plus	0,75–1	1x
Obilniny		0,75–1	2x
Cukrovka	A. Plus v sledu dvou ošetření	2 x 0,75	2x
	A. Plus následován O. Top	0,75 a 1,0	-

## Řepka

### ► Spektrum účinnosti

Acanto Plus je vysoce účinný přípravek pro ošetření řepky vůči **hlízence (sklerotiniové hnilobě), alternáriové skvrnitosti a fómové hnilobě**. V plné dávce přípravek účinkuje i proti plísni zelné. Ošetření vůči hlízence se provádí preventivně, podle signalizace, a to v době na počátku květu až do konce kvetení (BBCH 60–69). Na základě zonálních dat společností působí přípravek Acanto Plus i proti šedé hnilobě a fómové hnilobě při aplikaci v jarním období (BBCH 31), konkrétně v počátku dlouhivého růstu.

Řepka olejka		
Hlízenka obecná	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	◆◆◆◆
Alternáriová skvrnitost	<i>Alternatia spp.</i>	◆◆◆◆
Fómová hniloba brukvovitých	<i>Phoma lingam</i>	◆◆◆◆
Plíseň zelná	<i>Peronospora parasitica</i>	◆◆◆◆
Plíseň šedá	<i>Botrytis cinerea</i>	◆◆◆◆

Účinnost: výborná ◆◆◆◆ dobrá ◆◆◆ slabá ◆◆ nedostatečná ◆

## ► Doporučená aplikace

Vyšší dávku 1 l/ha z rozpětí použijte v případě vysokého infekčního tlaku houbových chorob. V případě sníženého tlaku bílé hniloby můžete aplikovat dávku 0,75 l/ha. Aplikaci provádíme na počátku květu nebo v plném květu. Optimálně však podle signalizace. Maximální počet ošetření 1 x za sezonu.

## Cukrovka

### ► Spektrum účinnosti

Proti cercosporióze, ramuláriové skvrnitosti a padlí doporučujeme spolehlivou dávku 1 l/ha preventivně, resp. při prvním výskytu infekce. V systému dvojího ošetření Acanto Plus 0,75 l/ha a pak Opus Top 1 l/ha nebo Acanto Plus 0,75 l/ha a Acanto Plus 0,75 l/ha. Maximální počet použití je 2 x za rok.

