



# Opus<sup>®</sup> Top

Účinná látka: epoxykonazol 84 g/l + fenpropimorf 250 g/l

**Systémový fungicid pro zajištění kvality produkce v obilovinách a cukrovce.**

- Fungicid proti širokému spektru houbových chorob pšenice, ječmene a cukrovky
- Vynikající TM partner (zejména pro přípravek Acanto)
- Silný účinek proti padlí

## ► Působení přípravku (systém účinku)

Fungicidní přípravek Opus Top obsahuje dvě účinné látky – epoxykonazol a fenpropimorf.

Epoxykonazol je systémová fungicidní látka, která je rychle a efektivně rozváděna po celé rostlině a má jak preventivní, tak kurativní a eradikativní účinek.

Účinná látka fenpropimorf je také plně systémová, v rostlině je translokována akropetálně xylemem a má preventivní a kurativní účinek. Má výbornou účinnost na padlí travní.

## ► Spektrum účinnosti

Pšenice		
Braničnatka plevová	<i>Leptosphaeria nodorum</i>	◆◆◆◆
Braničnatka pšeničná	<i>Mycosphaerella graminicola</i>	◆◆◆◆
Helminthosporiáza pšenice (DTR)	<i>Helminthosporium tritici-repentis</i>	◆◆◆◆
Padlí travní	<i>Erysiphe graminis</i>	◆◆◆◆
Rez pšeničná	<i>Puccinia recondita</i>	◆◆◆◆
Rez plevová	<i>Puccinia striiformis</i>	◆◆◆◆

Ječmen		
Hnědá skvrnitost	<i>Pyrenophora teres</i>	◆◆◆◆
Rynchosporiová skvrnitost	<i>Rhynchosporium secalis</i>	◆◆◆◆
Ramuláriová skvrnitost	<i>Ramularia collo-cygni</i>	◆◆◆◆
Rez ječná	<i>Puccinia hordei</i>	◆◆◆◆

Cukrová řepa		
Cerkosporiáza řepy	<i>Cercospora beticola</i>	◆◆◆◆

Účinnost: výborná ◆◆◆◆ dobrá ◆◆◆◆ slabá ◆◆ nedostatečná ◆

## ► Doporučená aplikace

Přípravek Opus Top používejte v pšenici a ječmeni proti listovým a klasovým chorobám podle potřeby na začátku výskytu chorob, zejména mezi BBCH 32-59 (druhé kolénko až konec metání).

Přípravek Opus Top aplikujte v cukrové řepě preventivně nebo ihned po zjištění prvních příznaků choroby.

**Doporučení dávky pro ošetření pšenice a ječmene**

Pro směsi tank-mix s jinými fungicidy (Acanto)	0,5–0,8 l/ha
Maximální dávka a počet ošetření za rok	2 x 1 l/ha/plodina/rok
Interval mezi aplikacemi	21 dní

**Doporučení dávky pro ošetření cukrové řepy**

Maximální dávka a počet ošetření za rok	2 x 1 l/ha/plodina/rok
Interval mezi aplikacemi	21 dní

