



Vydate® 10 G

Účinná látka: oxamyl 100 g/kg (10 % obj.)

Jedinečný nematocid pro použití v ochraně zeleniny, brambor, cukrovky a jiných plodin.

- ▶ Kontaktní a systémový granulovaný nematocid
- ▶ Účinný vůči širokému spektru háďátek a některých druhů škodlivého hmyzu
- ▶ Možné zapravení do půdy plošně nebo do řádků



▶ Působení přípravku (systém účinku)

Vydate 10 G je kontaktní a systémově účinný granulovaný nematocid ze skupiny karbamátů. Chrání vaše plodiny před širokým spektrem háďátek (*Meloidogyne* spp., *Globodera pallida*, *Heterodera* spp., *Longidorus* spp., *Paratrichodorus* spp., *Pratylenchus* spp., *Ditylenchus dipsaci*, *Trichodorus* spp.) a některým druhům škodlivého hmyzu (maločlenec čárkovitý, chvostokoci). Po zapravení do půdy (plošně/do řádků) je absorbován kořeny a translokován do rostlin.

Bez omezení z hlediska rotace plodin.

Háďátka *Pratylenchus penetrans* - škůdce zeleniny





▣ Doporučená aplikace

Plodina	Škůdce	Dávka kg/ha	Nejpozdější termín aplikace	OL
Brambory	hádátka	20-40	před výsadbou plošně se zapravením	1 x za sezónu, AT
	hádátka řepné	25		
Cukrovka	hádátka kořenové	15	při výsevu do řádku se zapravením	
	volně žijící hádátka	10		
Růžičková kapusta	hádátka	20-40	Před setím/výsadbou plošně se zapravením	
Mrkev (svazková, zimní, karotka), petržel kořenová, pastinák	hádátka	40	před setím/výsadbou plošně se zapravením	
		10	při setí do řádku se zapravením	

▣ Maximalizace benefitů při aplikaci přípravku Vydate 10 G

1. Minimalizujte čas mezi aplikací a setím/sadbou
2. Zapravte Vydate 10 G do vrchní vrstvy půdy (10 - 15 cm)
3. Použijte správné dávkování

